



پژوهش توانبخشی در پرستاری

دوره اول شماره ۱ پاییز ۱۳۹۳

- ۱..... بررسی تأثیر تحریکات چند حسی بر بهره حافظه سالمندان ساکن خانه‌های سالمندان شهر اهواز
ایمان مقدسی فر، لیلا فخارزاده، مالک فریدونی مقدم، محمدحسین حقیقی زاده
- ۱۲..... تأثیر گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
جاسم بهرامیان، کیانوش زهراکار، محسن رسولی
- ۲۳..... کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین اصلی عضو خانواده‌های کودکان مبتلا به معلولیت جسمی - حرکتی
تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایلام
الهام حسینی، سیده فاطمه حق دوست اسکویی، صدیقه خنجری، محمد حیدری، منصوره قدوسی
- ۳۲..... مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم‌بینایان با افراد سالم در مؤسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال ۱۳۹۲
محسن دهقانی، منیر نظری
- ۴۲..... بررسی اثربخشی یک دوره تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی و عزت نفس پرستاران
سید رضا سعادت مهر، کیان نوروزی، ندا خالدی، فرشته بخشیان، پوریا رضا سلطانی
- ۵۱..... تأثیر مراقبت معنوی - مذهبی بر اضطراب بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب
فرشته تاج‌بخش، محمدعلی حسینی، محسن صادقی قهرودی، مسعود فلاحی خشک‌ناب، اصغر رکوفیان، مهدی رهگذر
- ۶۲..... مقایسه موانع و تسهیل کننده‌های شرکت در برنامه بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر و
کارشناسان توانبخشی قلبی
زینب حاج علی اکبری، محمد علی حسینی، کیان نوروزی، مهدی رهگذر
- ۷۴..... نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه: یک مطالعه کیفی
فاطمه پاشایی ثابت، کیان نوروزی تبریزی، حمیدرضا خانکه، مسعود فلاحی خشک‌ناب

به نام خداوند جان و خرد

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران

دوره اول، شماره ۱ - پاییز ۱۳۹۳

- صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
- مدیر مسؤول: دکتر کیان نوروزی
- سردبیر: دکتر مسعود فلاحي خشکتاب
- مدیر اجرایی: خانم زهرا تمیزی
- کارشناس نشریه: خانم اکرم پورولی
- شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۳۲۹۶۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

- دکتر نرگس ارسلانی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر اصغر دالوندی، استادیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد
- دکتر مریم روانی پور، دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
- دکتر عباس عبادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
- دکتر مسعود فلاحي خشکتاب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار آموزش پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر فرحناز محمدی، دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر سهیل نجفی، استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
- دکتر منیر نوبهار، دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان
- دکتر کیان نوروزی تبریزی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر علیرضانیکیخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دکتر مجیده هروی کریموی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهد
- دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

• حروفچینی و صفحه آرایی: مهندس صادق توکلی

• طراح جلد: مهندس صادق توکلی

• ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران

• نشانی: تهران میدان توحید-دانشکده پرستاری و مامایی تهران

• کدپستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱ صندوق پستی: ۱۴۱۹۵/۳۹۸ تلفن و نمابر: ۶۶۵۹۲۵۳۵

E-mail: info@ijrn.ir, **Website:** http://ijrn.ir

مقایسه دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر و کارشناسان توانبخشی قلبی در مورد

موانع و تسهیل کننده های شرکت در برنامه بازتوانی قلبی

زینب حاج علی اکبری^۱، *محمد علی حسینی^۲، کیان نوروزی^۳، مهدی رهگذر^۴

چکیده

مقدمه: در مقایسه با پیشرفت‌هایی که در درمان بیماری‌های عروق کرونر قلب و مراقبت‌های ویژه قلبی در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، توسعه برنامه‌های بازتوانی قلبی قابل توجه نبوده است. این پژوهش با هدف تعیین موانع و تسهیل کننده‌های شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر و کارشناسان بازتوانی قلبی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی تحلیلی شامل کلیه کارشناسان بازتوانی قلبی استان آذربایجان شرقی (۱۱ نفر) و بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر قلب در سه ماهه اول سال ۹۲ در استان آذربایجان شرقی (۱۰۳ نفر) بودند که از طریق تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته‌ای جمع‌آوری گردید که روایی آن با روش لاواشه با نظر اساتید و پایایی آن توسط روش بازآزمایی در مطالعه آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کولموگراف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی تحت نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: مهم‌ترین موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان شامل عدم شناخت برنامه‌ها، عدم ارجاع توسط پزشک و هزینه‌های بازتوانی و مهم‌ترین تسهیل کننده‌ها از نظر کارشناسان شامل ارجاع توسط پزشک، پیگیری تیم توانبخشی، تخفیف هزینه‌ها، برگزاری کلاس‌ها در شیفت‌های مختلف و راه‌اندازی مراکز در شهرستان‌ها بود و مهم‌ترین موانع از دیدگاه بیماران شامل عدم ارجاع بیماران توسط پزشک، عدم شناخت برنامه‌های بازتوانی قلبی و عدم تماس و پیگیری تیم درمان و مهم‌ترین تسهیل کننده‌ها از نظر بیماران شامل توصیه برنامه‌ها توسط پزشک، اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌ها و راه‌اندازی مراکز بازتوانی قلبی در شهرستان‌ها بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد موانع مختلفی برای شرکت در برنامه توانبخشی وجود دارد که مهمترین آنها عدم شناخت و آگاهی بیماران از برنامه‌های بازتوانی قلبی، عدم ارجاع توسط پزشک، عدم پیگیری تیم توانبخشی و هزینه‌های سنگین بازتوانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها: توانبخشی قلبی، موانع، تسهیل کننده‌ها.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۳/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۳۰

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

۲- دانشیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

پست الکترونیکی: mahmaimy2020@gmail.com

۳- استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

۴- دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

مقدمه

بیماری های قلبی از عوامل عمده مرگ و میر و بستری شدن در کشورهای در حال توسعه می باشد (۱) به طور کلی ۲۵ درصد موارد مرگ و میر در دنیا و ۳۲ درصد موارد مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (۲). بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۲ درصد علل مرگ و میر در ایران ناشی از بیماری های قلبی و عروقی می باشد (۳). تعداد زیادی از بیماران عروق کرونر به درمان های دارویی پاسخ نداده و نیاز به عمل جراحی پیوند عروق کرونر دارند به طوری که سالانه ۵۵۳۰۰۰ نفر در آمریکا تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار می گیرند. در ایران سالانه بالغ بر سی هزار جراحی قلب باز در مراکز مختلف درمانی انجام می پذیرد (۴) ۶۰ درصد کل جراحی های قلب و عروق مربوط به جراحی بای پس عروق کرونر می باشد که با توجه به افزایش نیاز و تمایل به انجام جراحی اهمیت توجه ویژه به این گونه بیماران و افزایش کیفیت زندگی پس از جراحی را ضروری می سازد (۵) سازمان بهداشت جهانی و موسسه جهانی قلب، بازتوانی قلبی را یک مراقبت مهم و اساسی بعد از عمل قلب باز اعلام نموده است (۶). توانبخشی قلبی یک برنامه گروهی و بین رشته ای جهت کاهش خطرات از طریق آموزش فردی و گروهی و فعالیت جسمی می باشد و هدف آن ارتقاء کیفیت زندگی و بازگشت بیمار به سبک زندگی قبل از ناخوشی، بهبود وضعیت روانی- اجتماعی، تفریح و پیشگیری از بروز حوادث قلبی می باشد (۷). به عبارتی دیگر هدف نهایی از بازتوانی قلبی بازگرداندن و حفظ وضعیت بهینه فیزیولوژیکی، روانی- اجتماعی و شغلی بیمار است (۸). شواهد نشان داده است که میزان مرگ و میر و ناخوشی در کسانی که در برنامه های بازتوانی قلبی شرکت کرده اند ۲۵ درصد (۹، ۱۰) و میزان انفارکتوس میوکارد مجدد در آن ها ۲۹ درصد کاهش داشته است (۱۱) و این در حالی است که فقط ۲۵ - ۲۰ درصد از بیماران قلبی در برنامه های بازتوانی قلبی شرکت می کنند (۱). در ایران بررسی های کمی در خصوص بازتوانی قلبی انجام گرفته و مراکز نوتوانی قلبی نیز با استقبال چندانی روبرو نشده اند (۱۲) و تنها

۳۰ درصد از افراد واجد شرایط به این مراکز مراجعه می کنند و از این میان نیز تعدادی برنامه ها را نیمه کاره رها می کنند (۱۳). مطالعات زیادی در رابطه با موانع بازتوانی قلبی از نقطه نظر بیماران انجام شده است، به طوری که عواملی چون وضعیت زندگی، عدم دسترسی به حمل و نقل مناسب، بیمه، ترس از بازتوانی قلبی و نگرانی هایی از قبیل هزینه و متعهد بودن به زمان و همچنین درک بیماران از سلامتی، توانایی رانندگی و سطح تحصیلات بر میزان شرکت در بازتوانی قلبی تأثیرگذار بود (۴). نتایج مطالعه Daniels و همکاران نشان داد عواملی چون عدم ارجاع از سوی پزشک به عنوان مانعی مهم برای عدم شرکت در بازتوانی قلبی می باشد که گویای آن است که حمایت و تأیید پزشک از بازتوانی قلبی امری مهم در شرکت در برنامه بازتوانی قلبی به حساب می آید (۱۴). بازتوانی قلبی به عنوان جزء مهم مراقبت بعد از عمل جراحی عروق کرونر قلب و یک فرایند همه جانبه با هدف ارتقاء و حفظ سلامت قلبی عروقی می باشد که با به کارگیری برنامه های فردی و گروهی در جهت پیشگیری از پیشرفت بیماری، به حداکثر رساندن توانایی های فیزیکی و روانی- اجتماعی افراد و بهبود کیفیت زندگی، بهبود روحیه افراد، کاهش ناتوانایی ها و در نهایت کاهش مرگ و میر گام برمی دارد (۱۵) عدم پیگیری برنامه های بازتوانی توسط بیماران، از علل مؤثر کاهش کارایی مراقبت ها و در نتیجه کاهش کیفیت مطلوب این برنامه ها است (۱۶) که به عنوان یک چالش اساسی در پیشگیری ثانویه بیماران قلبی محسوب می شود (۱۷). با توجه به این که از یک سو مطالعات انجام یافته موانع و تسهیل کننده های بازتوانی قلبی را از دیدگاه بیماران مورد ارزیابی قرار داده و تاکنون دیدگاه کارشناسان بازتوانی قلبی مورد بررسی قرار نگرفته است و از سویی دیگر با توجه به اهمیت و نقشی که بازتوانی قلبی در بهبود و درمان بیماری های قلبی دارد پژوهشگر تصمیم به بررسی مقایسه ای موانع و تسهیل کننده های شرکت بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در برنامه بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر قلب و کارشناسان توانبخشی قلبی استان آذربایجان شرقی

گرفت تا بتواند راهکارهای مناسبی جهت افزایش شرکت این بیماران در بازتوانی قلبی را فراهم نماید.

روش مطالعه

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال ۹۲ انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر در استان آذربایجان شرقی بودند که با استفاده از روش سرشماری، ۱۰۳ نفر از بیماران جراحی شده پیوند عروق کرونر که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین کلیه کارشناسان بازتوانی قلبی در استان آذربایجان شرقی که تعداد آن ها ۱۱ نفر بود نیز از طریق سرشماری انتخاب شدند که این کارشناسان شامل پرستاران توانبخشی، فیزیوتراپ، متخصص طب فیزیکی و پزشک عمومی بودند. محیط پژوهش این مطالعه شامل ۳ بیمارستان در استان آذربایجان شرقی که عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب در آن انجام می گردید و همچنین محیط پژوهش برای کارشناسان توانبخشی قلبی شامل یک مرکز دولتی و یک مرکز خصوصی توانبخشی قلبی در استان آذربایجان شرقی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته موانع بازتوانی قلبی بود. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک شامل اطلاعات سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، تاریخ عمل جراحی، سابقه شرکت در بازتوانی قلبی بود. پرسشنامه محقق ساخته موانع بازتوانی قلبی شامل پرسشنامه ترجمه و مناسب سازی شده موانع بازتوانی قلبی (CRBs) که حاوی ۲۱ سؤال بسته پاسخ در زمینه موانع بازتوانی قلبی و بخش دوم آن برگرفته از پرسشنامه موانع شرکت در بازتوانی قلبی (CREO) و سؤالات اقتباس شده از بررسی متون مختلف بود که با این پرسشنامه ادغام گردید. این پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال بود که آزمودنی ها پاسخ خود را در مقیاس لیکرت پنج درجه ای از بسیار موافق تا بسیار مخالف با امتیاز ۵-۱ مشخص می نمودند و اندازه گیری میانگین پاسخ به هر سؤال موردسنجش قرار گرفت.

با استفاده از روش لاواشه نظر ۱۱ تن از اساتید برای روایی صوری و محتوایی اخذ و میزان شاخص روایی محتوایی پرسشنامه بررسی موانع بازتوانی قلبی ۰/۶۷ به دست آمد که بعد از روایی یکی از سؤالات به دلیل عدم امتیاز کافی توسط متخصصان حذف شد و پرسشنامه مورد استفاده حاوی ۲۴ سؤال گردید. پایایی این ابزار در یک مطالعه آزمایشی بر روی ۱۳ تن از بیماران با استفاده از ضریب بازآزمایی و آلفای کرونباخ موردسنجش قرار گرفت که مقدار ضریب باز آزمایی این پرسشنامه ۰/۸۳۱ و ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸ محاسبه گردید. پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان های منتخب مراجعه نموده و پس از دریافت لیست اسامی و شماره تلفن کلیه بیمارانی که در سه ماهه اول سال ۹۲ تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته بودند درمجموع ۱۰۳ بیمار واجد شرایط را از طریق سرشماری انتخاب و با آن ها تماس تلفنی گرفت و پس از معرفی خود و توضیح در مورد اهداف پژوهش، از آن ها درخواست گردید که جهت انجام پژوهش در بخش توانبخشی قلبی بیمارستان مدنی حضور یابند و به آن دسته از بیمارانی که ساکن شهر تبریز نبوده و امکان حضور در شهر تبریز را نداشتند، به صورت تلفنی سؤالات پرسشنامه عیناً برای آن ها خوانده شد و پرسشنامه ها تکمیل گردید. پژوهشگر برای تکمیل پرسشنامه ها توسط کارشناسان توانبخشی، پس از مکاتبه و مراجعه به مدیران مراکز مربوطه و ارائه توضیحات لازم در زمینه موضوع و اهداف پژوهش و اخذ مجوز تحقیق، با نمونه های تحقیق نیز مذاکره و توضیحات لازم داده شد و پس از اخذ رضایت آگاهانه و کتبی آنها جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه ها را در اختیار آنان قرار داد. برای تعیین تسهیل کننده های شرکت در بازتوانی قلبی یک سؤال به صورت باز پاسخ در پرسشنامه در نظر گرفته شد "چه راهکارهایی را برای افزایش شرکت در بازتوانی قلبی پیشنهاد می کنید؟" که با محاسبه تعداد دفعات تکرار داده ها فراوانی آن به صورت کمی به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین، دامنه و

آزمون های کولموگراف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد که در گروه بیماران ۶۳/۱ درصد واحدهای مورد پژوهش مرد، ۳۳ درصد دارای میانگین سنی ۵۳-۶۰ سال، ۳۳ درصد بی سواد، ۸۸/۳ درصد متأهل، ۳۵/۹ درصد خانه دار، ۹۹ درصد دارای بیمه درمانی، ۶۶ درصد ساکن تبریز و ۹۵/۱ درصد از آن ها در هیچ برنامه بازتوانی قلبی شرکت نکرده بودند. همچنین یافته ها بیانگر آن بود که در گروه کارشناسان ۶۳/۴ درصد واحدهای مورد پژوهش زن، ۴۵/۲ درصد دارای میانگین سنی ۲۹-۳۶ سال، ۳۶/۴ درصد متخصص طب فیزیکی، ۵۴/۵ درصد دارای مدرک کارشناسی، ۴۵/۵ درصد دارای سابقه کاری ۱۴-۹ سال، ۵۴/۵ درصد دارای پست سازمانی کارشناسی بالینی و ۹۰/۹ درصد از آن ها در بخش دولتی مشغول به کار بودند.

بعلاوه نتایج پژوهش نشان داد بالاترین میانگین نمره موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران به ترتیب نزولی (۴/۵۴، ۴/۵۳، ۴/۴۳، ۳/۴۳، ۳/۰۲) مانع "عدم ارجاع بیماران توسط پزشک جهت بازتوانی قلبی"، "عدم شناخت از برنامه های بازتوانی قلبی"، "عدم تماس و پیگیری کادر درمان"، "شرایط آب و هوایی بد" و "هزینه های بازتوانی" بودند که از مهم ترین موانع عدم شرکت بیماران CABG در برنامه های بازتوانی قلبی از دیدگاه این بیماران به شمار می روند. همچنین بالاترین میانگین نمره موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان به ترتیب نزولی (۴/۹۱، ۴/۶۴، ۴/۳۶، ۴/۲۷، ۴/۱۸) مربوط به ۵ مانع

جدول شماره ۱: توزیع شاخص های آماری موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران

موانع شرکت در بازتوانی قلبی	میانگین	انحراف معیار	شماره اولویت
پزشک به من گفته است که نیاز به بازتوانی قلبی ندارم	۴.۵۴	۱.۱۷	۱
از برنامه های بازتوانی قلبی شناخت نداشتم	۴.۵۳	۱.۱۲	۲
برای شرکت در بازتوانی قلبی کادر درمان به من توصیه ای نکرده اند یا تماس نگرفته اند	۴.۴۳	۱.۲۷	۳
گرمای زیاد یا سرمای زیاد هوا اذیت می کند و نمی توانم برای بازتوانی از منزل خارج شوم	۳.۴۳	۱.۲۳	۴
هزینه ها (به طور مثال هزینه های رفت و آمد به کلینیک)	۳.۰۲	۱.۶۵	۵
مشکلات رفت و آمد به کلینیک	۲.۹۲	۱.۸۱	۶
فاصله زیاد منزل تا کلینیک	۲.۷۸	۱.۸۲	۷

"عدم شناخت از برنامه های بازتوانی قلبی"، "عدم ارجاع بیماران توسط پزشک جهت بازتوانی قلبی"، "هزینه های بازتوانی"، "عدم تماس و پیگیری کادر درمان" و "فاصله زیاد" می باشد که از مهم ترین موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان بازتوانی قلبی محسوب شدند (جدول ۱ و ۲).

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که توصیه برنامه های بازتوانی توسط پزشک، اطلاع رسانی در مورد برنامه ها از طریق کادر درمان و یا رسانه ها، تخفیف هزینه ها و راه اندازی مراکز بازتوانی در سایر شهرهای استان به ترتیب نزولی از مهم ترین تسهیل کننده های بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران بودند و همچنین ارجاع بیماران توسط پزشکان، پیگیری کادر توانبخشی، تخفیف هزینه ها، برگزاری کلاس ها در سه شیفت و راه اندازی مراکز بازتوانی در سایر شهرستان ها به ترتیب نزولی از مهم ترین تسهیل کننده های شرکت بیماران در برنامه های بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان محسوب شدند (جدول ۳ و ۴).

یافته های پژوهش بیانگر آن بود که در زمینه موانع بازتوانی قلبی تفاوت معنی داری بین دیدگاه های کارشناسان و بیماران از نظر مشکلات رفت و آمد، عدم شناخت برنامه های بازتوانی قلبی، مشکلات مربوط به بدی آب و هوا، عدم ارجاع توسط پزشک و عدم پیگیری و توصیه کادر درمان وجود ندارد ($P > 0.05$) در واقع این موارد از مهم ترین موانع اصلی بازتوانی قلبی در دو گروه ذکر شده اند، درحالی که سایر موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه این دو گروه مشاهده گردید (جدول ۵).

جدول شماره ۲: توزیع شاخص های آماری موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان

موانع شرکت در بازتوانی قلبی	میانگین	انحراف معیار	شماره اولویت
از برنامه های بازتوانی قلبی شناخت کافی ندارند	۴.۹۱	۰.۳۰	۱
پزشک به آن ها گفته است که به بازتوانی قلبی نیاز ندارند	۴.۶۴	۰.۶۷	۲
هزینه ها	۴.۳۶	۰.۶۷	۳
برای شرکت در بازتوانی قلبی کادر درمان به آنها توصیه ای نکرده یا تماس نگرفته اند	۴.۳۷	۱.۱۹	۴
فاصله زیاد	۴.۱۸	۰.۸۷	۵
از خدمات بیمه برخوردار نیستند یا بیمه هزینه های توانبخشی را پوشش نمی دهد	۴	۰.۶۳	۶
مشکلات رفت و آمد	۳.۷۳	۰.۶۴	۷

جدول شماره ۳: تسهیل کننده های بازتوانی از دیدگاه بیماران

تسهیل کننده ها	فراوانی
توصیه پزشک جهت بازتوانی	۱۰۳ نفر
اطلاع رسانی	۹۷ نفر
راه اندازی مراکز بازتوانی در شهرستان ها	۳۵ نفر
تخفیف هزینه ها	۴۵ نفر

جدول شماره ۴: تسهیل کننده های بازتوانی قلبی از دیدگاه کارشناسان

تسهیل کننده ها	فراوانی
ارجاع توسط پزشک	۱۱ نفر
پیگیری و تماس کادر توانبخشی	۱۱ نفر
تخفیف در هزینه ها	۱۱ نفر
برگزاری کلاس ها در سه شیفت (صبح، عصر، شب)	۶ نفر
راه اندازی مراکز بازتوانی در شهرستان ها	۵ نفر

جدول شماره ۵: مقایسه موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه ۲ گروه بیماران CABG و کارشناسان بازتوانی قلبی

موانع	گروه ها	بیماران	کارشناسان	P value
فاصله زیاد منزل تا کلینیک	۲.۷۸	۱.۸۲	۴.۱۸	۰.۰۳۴
هزینه ها	۳.۰۲	۱.۶۵	۴.۳۶	۰.۰۱۶
مشکلات رفت و اما تا کلینیک	۲.۹۲	۱.۸۱	۳.۷۳	۰.۳۱۸
درگیر مسئولیت خانواده هستم	۱.۴۲	۰.۹۵	۲.۵۵	۱.۰۳
از برنامه های بازتوانی قلبی شناخت کافی نداشتم	۴.۵۳	۱.۱۲	۴.۹۱	۰.۳۰
من همیشه در خانه یا باشگاه ورزش می کنم	۱.۲۴	۰.۶۱	۲.۰۹	۰.۷۰
من نیاز به بازتوانی قلبی ندارم	۱.۶۱	۰.۹۶	۲.۹۱	۱.۳۰
گرمی یا سردی زیاد هوا اذیتم می کنم و نمی توانم برای بازتوانی قلبی از منزل خارج شوم	۳.۴۳	۱.۲۳	۲.۹۱	۰.۷۰
انجام ورزش های بازتوانی حالم را بدتر می کنم و به همین دلیل ترجیح می دهم در برنامه های بازتوانی شرکت نکنم	۱.۴۳	۰.۹۲	۲.۱۸	۰.۸۷
درگیر مسئولیت کاری هستم	۱.۶۸	۱.۳۴	۳.۶۴	۱.۱۲
انرژی کافی برای بازتوانی قلبی ندارم	۱.۳۱	۰.۷۲	۲.۳۶	۱.۰۲
به دلیل پیری و از کارافتادگی نمی توانم در بازتوانی قلبی شرکت کنم	۱.۳۱	۰.۷۲	۲.۷۳	۰.۷۸
پزشک به من گفته است که نیاز به بازتوانی قلبی ندارم	۴.۵۴	۱.۱۷	۴.۶۴	۰.۶۷
بسیاری از افراد باوجود مشکلات قلبی به بازتوانی نمی روند و باین وجود، حالشان خوب است	۱.۴۷	۰.۸۰	۳.۰۹	۰.۸۳
من خودم می توانم مشکلات قلبی ام را مدیریت کنم	۱.۳۳	۰.۶۷	۲.۶۴	۰.۹۲

۴۰۴۳	۱۰۲۷	۴۰۲۷	۱۰۱۹	۰۰۶۴۱	برای شرکت در بازتوانی قلبی کادر درمان به من توصیه‌ای نکرده‌اند یا تماس نگرفته‌اند
۱۰۰۶	۰۰۳۰	۱۰۵۵	۰۰۹۳	۰۰۰۰۰	زمان انتظار در لیست بازتوانی قلبی طولانی است
۱۰۱۴	۰۰۴۸	۱۰۵۵	۰۰۶۸	۰۰۰۰۱	ترجیح می‌دهم مراقبت قلبی به تنهایی داشته باشم نه به صورت گروهی
۱۰۷۱	۱۰۳۶	۳۰۵۵	۰۰۸۲	۰۰۰۰۰	وقتی که برای بازتوانی قلبی به من داده‌اند مناسب نیست و دران زمان نمی‌توانم مراجعه کنم
۱۰۸۹	۱۰۲۹	۳۰۲۷	۰۰۷۸	۰۰۰۰۰	خانواده از من حمایت کافی نمی‌کند
۱۰۹۷	۱۰۱۵	۳۰۳۶	۰۰۶۷	۰۰۰۰۰	انگیزه‌ای برای بازتوانی قلبی ندارم
۱۰۷۳	۰۰۹۴	۲۰۶۴	۰۰۹۲	۰۰۰۰۱	احساس می‌کنم برنامه توانبخشی برایم بی‌فایده است
۱۰۱۷	۰۰۷۰	۴	۰۰۶۳	۰۰۰۰۰	از خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستم یا بیمه هزینه‌های توانبخشی را پرداخت نمی‌کند

بحث

در این مطالعه بیماران و کارشناسان، موانعی همچون "عدم ارجاع بیماران توسط پزشک جهت بازتوانی قلبی"، "عدم شناخت از برنامه‌های بازتوانی قلبی"، "عدم تماس و پیگیری کادر درمان" را جزء مهمترین مانع شرکت در برنامه های بازتوانی قلبی برشمردند که بیش از ۸۰ درصد از بیماران و کارشناسان در این موارد اتفاق نظر داشتند. نتایج مطالعه YMW و همکاران در زمینه موانع بازتوانی قلبی از دیدگاه بیماران و کارشناسان نیز نشان داد که توصیه و تشویق پزشکان می‌تواند انگیزه افراد برای شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را افزایش دهد (۱۸). همچنین نتایج مطالعه Dunlay و همکاران نشان داد که بیمارانی که برای اولین بار تحت مراقبت کاردیولوژیست در بیمارستان قرار گرفته و همچنین آن دسته از بیمارانی که دوره‌های آموزشی در این خصوص را سپری نموده و دارای درک بهتری از اهمیت بازتوانی و پیامدهای مثبت آن بودند بیشترین میزان شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را داشته‌اند (۱۹). Shanks و همکاران نیز معتقدند توصیه پزشک ارتباط قوی در شروع برنامه‌های بازتوانی قلبی دارد (۲۰) علاوه بر این نتایج مطالعه Ades و همکاران نیز رابطه قوی بین توصیه پزشک و شروع برنامه‌های بازتوانی قلبی را نشان داده است به طوری که با توصیه قطعی پزشک میزان مشارکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی ۶۶ درصد و در صورت عدم توصیه پزشکی این مشارکت به ۱/۸ درصد کاهش یافته بود (۲۱). نتایج مطالعات با یافته‌های پژوهش حاضر مطابقت دارد. انجمن قلب آمریکا اخیراً بر اهمیت گسترش و دسترسی به بازتوانی قلبی و

نقش ارزشمند متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در افزایش ارجاع به بازتوانی قلبی تأکید کرده است (۲۲). در مطالعه حاضر عدم شناخت برنامه‌های بازتوانی قلبی و دانش ناکافی در مورد آن‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع بازتوانی قلبی شناخته شده است. در مطالعه Rose و همکاران که با هدف بررسی موانع و تسهیل‌کننده‌های شرکت در بازتوانی قلبی انجام شده است نیز از کمبود دانش به عنوان یک عامل مهم در بازتوانی قلبی نام برده شده است (۲۳). در مطالعاتی که توسط Österberg و همکاران و Cooper و همکاران انجام شده است نیز به رابطه مثبت بین دانش ناکافی در مورد برنامه‌های بازتوانی قلبی و عدم شرکت در این برنامه‌ها اشاره شده است (۲۴، ۲۵). نتایج مطالعه Pullen و همکاران وجود رابطه‌ای معکوس بین دریافت دانش کافی از فرایند بیماری‌های قلبی و خودداری از شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را به اثبات رسانده است (۲۶). در مطالعه دیگری که توسط Grace و همکاران انجام شده است ارائه آموزش سرپایی در مورد برنامه‌های بازتوانی قلبی به طور قابل توجهی شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را افزایش داده به طوری که میزان شرکت در این برنامه‌ها ۶۵ تا ۸۴ درصد افزایش یافته است که ۵-۲ برابر بیشتر از موارد معمول بود (۲۷) و همچنین نتایج مطالعه Giannuzzi و همکاران بیانگر آن بود که برنامه آموزشی بازتوانی قلبی در بسیاری از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها وجود ندارد (۲۸) و این در حالی است که برنامه‌های آموزشی توانبخشی قلبی می‌بایست هم در سطوح پایه و هم در سطوح تخصصی و پیشرفته آموزش داده شود. در مطالعه حاضر از عدم تماس کادر درمان هم از دیدگاه

کارشناسان و هم از دیدگاه بیماران، نیز به عنوان موانع اصلی بازتوانی قلبی نام برده شد. این مورد از دیدگاه بیماران به عنوان سومین عامل و از دیدگاه کارشناسان به عنوان چهارمین عامل مطرح شده است. نتایج مطالعه Meillier و همکاران نشان داد که پیگیری منظم بیمارانی که امکان تماس در طول زمان بستری با آن‌ها وجود داشت، میزان شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را به طور معنی‌داری افزایش داده بود (۲۹). همچنین مطالعه دیگری که توسط Harkness و همکاران با هدف تأثیر تماس و پیگیری تلفنی بر میزان شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی انجام شده بود، نتایج نشان داد که میزان حضور در برنامه‌ها بازتوانی قلبی در گروهی که مداخله تماس تلفنی داشتند ۷۸/۱ درصد و در گروهی که مداخله تلفنی نداشتند ۵۰/۱ درصد گزارش شد (۳۰). تماس و پیگیری تیم درمان یک فرصت برای آموزش بیمار در مورد اثرات مثبت بازتوانی قلبی را فراهم می‌کند. در یک نظرسنجی تلفنی از ۳۰۴ بیمار بعد از CABG، ۴۶/۵ درصد از آن‌ها که در برنامه‌های بازتوانی قلبی شرکت نکرده بودند علت آن را کمبود دانش معرفی کرده بودند که در تصمیم‌گیری آن‌ها برای حضور در جلسات تأثیر داشته است (۳۱). در این راستا Pasquali و همکاران گزارش کردند که تماس و پیگیری تلفنی حدود ۱۲-۶ هفته پس از CABG در ارجاع به یک برنامه بازتوانی قلبی مؤثر بوده است و ۵۱-۳۱ درصد میزان شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را افزایش داده است (۳۲). نتایج مطالعات با یافته‌های پژوهش حاضر همسو می‌باشد. در مطالعه حاضر هزینه‌های بازتوانی قلبی از دیدگاه بیش از ۹۰ درصد از کارشناسان و بیش از ۴۰ درصد از بیماران به عنوان یک عامل مهم در عدم شرکت بیماران در برنامه‌های بازتوانی قلبی نام برده شده است. اطلاعات محدودی در رابطه با وضعیت اقتصادی اجتماعی و شرکت در بازتوانی قلبی وجود دارد. Nielsen و همکاران در مطالعه‌ای نشان دادند که بیماران قلبی با سطح درآمد کمتر تمایل کمتری برای شرکت در جلسات بازتوانی قلبی داشتند (۳۳) و به طور مشابه در مطالعه‌ای که توسط Sanderson و همکاران انجام شده بود سطح درآمد را

به عنوان یک عامل مهم در مشارکت بیماران زن در برنامه بازتوانی قلبی به شمار می‌آورد (۳۴). مشارکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی با ارائه برنامه‌ها رایگان در ارتباط بوده است (۳۵). برخلاف مطالعات فوق، نتایج مطالعه Fernandez و همکاران ارتباط معنی‌داری را بین سطح درآمد و مشارکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را نشان نداد در این مطالعه ذکر شده است که با توجه به اینکه سیستم‌های بهداشتی در استرالیا، برنامه‌های بازتوانی قلبی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند بنابراین عوامل دیگری به جز مشکلات اقتصادی در عدم مشارکت بیماران در برنامه‌های بازتوانی قلبی دخیل هستند که پژوهشگر فاصله زیاد از محل برگزاری برنامه‌ها از آن جمله دانسته است (۳۶) که این عامل بازدارنده پنجمین مانع از دیدگاه کارشناسان و هفتمین مانع از دیدگاه بیماران در مطالعه حاضر بود. گزارش‌ها محدودی در مورد اهمیت رفت‌وآمد و فاصله مکانی تا محل برگزاری برنامه‌های بازتوانی قلبی وجود دارد. De Angelis و همکاران از رفت‌وآمد به عنوان یک مانع مهم برای عدم شرکت در جلسات برنامه‌های بازتوانی قلبی نام برده است در این مطالعه ۹۷ نفر مورد بررسی قرار گرفتند که به طور تصادفی کسانی که در بازتوانی شرکت نکرده بودند به طور قابل توجهی فاصله طولانی‌تری از محل برنامه‌ها داشتند (۳۷). در مقایسه با پیشرفت‌هایی که در درمان بیماری‌های عروق کرونر قلب و مراقبت‌های ویژه قلبی در ایران در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، توسعه برنامه‌های بازتوانی قلبی قابل توجه نبوده است. وجود مراکز بازتوانی قلبی به نحوی که بیماران امکان دسترسی به آن‌ها را داشته باشند، بدون شک پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت. تعداد محدود مراکز بازتوانی قلبی، فقدان تیم بازتوانی قلبی در بیمارستان‌ها و عدم سیستم ارجاع بیماران واجد شرایط به مراکز بازتوانی قلبی باعث می‌شود تا بسیاری از بیماران در بازتوانی قلبی شرکت نکنند. Giannuzzi و همکاران در رابطه با ساختار مراکز بازتوانی قلبی معتقدند که توزیع نامناسب جغرافیایی برنامه‌های بازتوانی قلبی، مسافت‌های طولانی بین مراکز بازتوانی با محل زندگی و کار بیماران از جمله

موانع مشارکت بیماران در برنامه‌های بازتوانی قلبی محسوب می‌شوند (۲۸).

برخی از مراکز درمانی که در آن‌ها عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام می‌شود و عدم دسترسی برخی از بیماران به دلیل سکونت در شهرهای دیگری به‌جز آذربایجان شرقی اشاره کرد.

نتیجه‌گیری نهایی

یافته‌های این پژوهش نشان داد مهمترین موانع شرکت در برنامه بازتوانی قلبی عدم ارجاع بیماران توسط پزشک جهت بازتوانی قلبی، عدم شناخت از برنامه‌های بازتوانی قلبی و عدم تماس و پیگیری کادر درمان بوده و مهمترین تسهیل کننده های شرکت در این برنامه توصیه به شرکت در برنامه‌ها توسط پزشک، اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌ها و راه‌اندازی مراکز بازتوانی قلبی در شهرستان‌ها می باشد. ازجمله محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم همکاری مناسب برخی از کارشناسان توانبخشی به دلیل مشغله کاری زیاد، عدم همکاری

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می‌باشد. نویسندگان این مقاله بر خود لازم می‌دانند که از همکاری مدیریت محترم بیمارستان عالی‌نسب، بیمارستان مدنی و بیمارستان نور نجات و کارکنان مرکز توانبخشی مدنی استان آذربایجان شرقی و کلیه کارشناسان و بیمارانی که در این پروژه ما را همراهی کردند تشکر و قدردانی نمایند.

منابع

- 1- Cossette S, Frasure-Smith N, Dupuis J, Juneau M, Guertin M-C. Randomized Controlled Trial of Tailored Nursing Interventions to Improve Cardiac Rehabilitation Enrollment. *Nursing Research*. 2012; 61(2):111-120.
- 2- Hoseinzadeh T, Paryad A, Asiri S, Kazemnezhad Leili E. Relationship between perception of illness and general self-efficacy in coronary artery disease patients. *Holistic nursing and midwifery. Journal of Nursing and Midwifery Faculties Guilan medical university*. 2012;22(67):1-8. [In Persian].
- 3- Sadeghzadeh.vida. Improved quality of life with cardiac rehabilitation in post-myocardial infarction patient. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*. 2012;3(2):394-401. [In Persian].
- 4- Asadinoghabi A, Shaban M, Faghihzadeh S, Asadi M. Effect of phase 1 cardiac rehabilitation on anxiety of patients with coronary artery bypass surgery candidates. *Hayat*. 2009;14(4-3):5-13. [In Persian].
- 5- Fayyazi S, Sayadi N, Gheybizadeh M. Comparison of Quality of Life before and After Open Heart Surgery. *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*. 2012;14(9):98-100. [In Persian].
- 6- Thurston N. What happens next? The role of cardiac rehabilitation in total patient care. *Heart, Lung and Circulation*. 2008;17(4):S63-S64.
- 7- Sharif F, Shoul A, Janati M, Kojuri J, Zare N. The effect of cardiac rehabilitation on anxiety and depression in patients undergoing cardiac bypass graft surgery in Iran. *BMC cardiovascular disorders*. 2012;12(1):40. [In Persian].

- 8- Koohestani HR, Baghcheghi N, Zand S. Impact of teaching cardiac rehabilitation programs on electrocardiogram changes among patients with myocardial infraction. Iranian journal of nursing research. 2010;5(16):6-12. [In Persian].
- 9- Leung YW, Brual J, Macpherson A, Grace SL. Geographic issues in cardiac rehabilitation utilization: A narrative review. Health & Place. 2010;16(6):119.۲۰۵-۶
- 10-Jackson L, Leclerc J, Erskine Y, Linden W. Getting the most out of cardiac rehabilitation: a review of referral and adherence predictors. Heart. 2005;91(1):10-14.
- 11-Shabani R, Nikbakht H, Niko MR, Gheragi a, Hojateslami S, SHirmohammadi T, et al. Effects of cardiac rehabilitation program on functional capacity, blood pressure, heart rate, recovery heart rate, and oxygen take heart after coronary artery bypass surgery. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Tehran Medical Unit. 201۱;21(2):108-113. [In Persian].
- 12-Asadi Samani Z, Marandi SM, Molavi H, Rabiei K, Mir-Mohammad Sadeghi M, Raeisi J. The effectiveness of one period exercise rehabilitation on anxiety and somatization of the CABG patients. Metabolism and Exercise Journal, 2011;1(2):129-139. [In Persian].
- 13-Davoodvand S, Ellahi N, Hosein HM. effects of Short-term cardiac rehabilitation programs on clinical course of acute myocardial infarction protests. Hayat. 2009;15(3):66-73. [In Persian].
- 14-Daniels KM, Arena R, Lavie CJ, Forman DE. Cardiac rehabilitation for women across the lifespan .The American Journal of Medicine. 2012;125(9):937.e1-e7.
- 15-Sin M-K, Sanderson B, Weaver M, Giger J, Pemberton J, Klapow J. Personal characteristics, health status, physical activity, and quality of life in cardiac rehabilitation participants. International journal of nursing studies. 2004;41(2):173-181.
- 16-Yohannes AM, Yalfani A, Doherty P, Bundy C. Predictors of drop-out from an outpatient cardiac rehabilitation programme. Clinical rehabilitation. 2007;21(3):222-229.
- 17-McKee G, Bannon J, Kerins M, FitzGerald G. Changes in diet, exercise and stress behaviours using the stages of change model in cardiac rehabilitation patients. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2007;6(3):233-240.
- 18-YMW M, WK C, CSS Y. Barriers to participation in a phase II cardiac rehabilitation programme. Hong Kong Med J. 2005;11(6): 472-475.
- 19-Dunlay SM, Witt BJ, Allison TG, Hayes SN, Weston SA, Koepsell E, et al. Barriers to participation in cardiac rehabilitation. American heart journal. 2009;158(5):852-859.
- 20-Shanks LC, Moore SM, Zeller RA. Predictors of cardiac rehabilitation initiation. Rehabilitation Nursing. 2007;32(4):152-157.
- 21-Ades PA, Waldmann ML, McCann WJ, Weaver SO. Predictors of cardiac rehabilitation participation in older coronary patients. Archives of Internal Medicine. 1992;152(5):1033.

- 22-Arena R, Williams M, Forman DE, Cahalin LP, Coke L, Myers J, et al. Increasing Referral and Participation Rates to Outpatient Cardiac Rehabilitation: The Valuable Role of Healthcare Professionals in the Inpatient and Home Health Settings A Science Advisory From the American Heart Association. *Circulation*. 2012;125(10):1321-1329.
- 23-Rose M, Timmons SM, Amerson R, Reimels E, Pruitt RH. Facilitators and Barriers in Cardiac Rehabilitation Participation. *The Journal for Nurse Practitioners*. 2011;7(5):399-408.
- 24-Österberg SA, Baigi A, Bering C, Fridlund B. Knowledge of heart disease risk in patients declining rehabilitation. *British Journal of Nursing*. 2010;19(5):288-93.
- 25-Cooper A, Jackson G, Weinman J, Horne R. A qualitative study investigating patients' beliefs about cardiac rehabilitation. *Clinical rehabilitation*. 2005;19(1):87-96.
- 26-Pullen S, Povey R, Grogan S. Deciding to attend cardiac rehabilitation: A female perspective. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*. 2009;16(4):207-217.
- 27-Grace SL, Angevaere KL, Reid RD, Oh P, Anand S, Gupta M, et al. Effectiveness of inpatient and outpatient strategies in increasing referral and utilization of cardiac rehabilitation: a prospective, multi-site study. *Implement Sci*. 2012;13(7):120.
- 28-Giannuzzi P, Saner H, Björnstad H, Fioretti P, Mendes M, Cohen-Solal A, et al. Secondary Prevention Through Cardiac Rehabilitation Position Paper of the Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal*. 2003;24(13):1273-1278.
- 29-Meillier LK, Nielsen KM, Larsen FB, Larsen ML. Socially differentiated cardiac rehabilitation: Can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction? *Scandinavian journal of public health*. 2012;40(3):286-293.
- 30-Harkness K, Smith KM, Taraba L, MacKenzie CL, Gunn E, Arthur HM. Effect of a postoperative telephone intervention on attendance at intake for cardiac rehabilitation after coronary artery bypass graft surgery. *Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care*. 2005;34(3):179-186.
- 31-King KM, Humen DP, Smith HL, Phan CL, Teo KK. Predicting and explaining cardiac rehabilitation attendance. *The Canadian journal of cardiology*. 2001;17(3):291-296.
- 32-Pasquali SK, Alexander KP, Lytle BL, Coombs LP, Peterson ED. Testing an intervention to increase cardiac rehabilitation enrollment after coronary artery bypass grafting. *The American journal of cardiology*. 2001;88(12):1415-1416.
- 33-Nielsen KM, Faergeman O, Foldspang A, Larsen ML. Cardiac rehabilitation: health characteristics and socio-economic status among those who do not attend. *The European Journal of Public Health*. 2008;18(5):479-483.
- 34-Sanderson BK, Shewchuk RM, Bittner V. Cardiac rehabilitation and women: what keeps them away? *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention*. 2010;30(1):12-21.

35-Asians S. Developing a culturally appropriate cardiac rehabilitation programme for Bengali speakers. *British Journal of Cardiac Nursing*. 2009;4(2):81.

36-Fernandez RS, Davidson P, Griffiths R. Cardiac rehabilitation coordinators' perceptions of patient-related barriers to implementing cardiac evidence-based guidelines. *Journal of Cardiovascular Nursing*. 2008;23(5):449-457.

37-De Angelis C, Bunker S, Schoo A. Exploring the barriers and enablers to attendance at rural cardiac rehabilitation programs. *Australian journal of rural health*. 2008;16(3):137-142.

Comparing viewpoint of patients with coronary artery bypass graft surgery and cardiac rehabilitation specialists about barriers and facilitators of attending to cardiac rehabilitation programs

Hajali Akbari Z¹, *Hosseini MA², Nourozi K³, Rahgozar M⁴

Abstract

Introduction: Although last advancement in the treatment of coronary artery disease and cardiac care was remarkable in recent decades, but cardiac rehabilitation programs hasn't been significant development. The aim of this study was to determine and compare obstacles and facilitators of attending cardiac rehabilitation programs from viewpoints of patients' with coronary artery bypass graft surgery and East Azerbaijan cardiac rehabilitation specialists.

Methods: It was a descriptive analytical study, statistical population Included all cardiac rehabilitation experts (11persons) of east Azerbaijan and all patients with CABG (103) were selected from East Azerbaijan by census. Data were gathered by scholar made questionnaire that its validity and reliability was determined by Lavashe method and retest coefficient and Cronbach alpha. Collected data was analyzed by KS-test, Spearman rank correlation and Mann-Whitneyin SPSS/19.

Result: The most important obstacles of cardiac rehabilitation from expert's viewpoint were lack of knowledge about program, no referral by doctor and rehabilitation costs and the most important facilitators were physician referrals, follow-up, discounting costs, holding courses in different shifts and launching rehabilitation centers in different towns. The most important obstacles from patients' viewpoint were no patient reference by doctor, lack of knowledge of cardiac rehabilitation programs and not following and contacting patient by treatment staff and the most important facilitators were physicians' advice to attend course, informing about programs and launching cardiac rehabilitation centers in towns.

Conclusion: According to the results of research, cardiac rehabilitation's obstacles such as, lack of Patients' knowledge, non-referral by physicians, failure to follow the staff rehabilitation and rehabilitation costs were considered.

Keywords: cardiac rehabilitation, barriers, facilitator.

Received: 17 June 2014

Accepted: 21 July 2014

1- MSc student in nursing, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran.

2- Associate Professor, Rehabilitation Administration Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran. (**Corresponding author**)

E-mail: mahmaimy2020@gmail.com

3- Assistant Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran.

4- Associate Professor, Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran.

- Effect of Multi - Sensory Stimulation on memory in Nursing home residents in Ahvaz.....1**
Moghaddasifar I, Fakharzadeh L, Fereidooni Mohamad M, Haghighi Zadeh H
- The effect of hope based group therapy approach on the severity of depression in multiple sclerosis patients.....12**
Bahramian J, Zahrakar K, Rasouli M
- Quality of life and its associated factors in primary family caregivers of children with physical disabilities under supervision of welfare organization Iran- Ilam.....23**
Hosseini E, Seyedeh Fatemeh Haghdost Oskouie, Khanjari S, Heidari M, Ghodusi M
- The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392.....32**
Mohsen Dehghani, Monir Nazari
- The effect of an aerobic training program on physical self-concept and self-esteem of nurses.....42**
Saadatmehr R, Nourozi K, Khaledi N, Bakhshian F, Rezasoltani P
- The effect of religious-spiritual care on anxiety post surgery coronary artery bypass graft patients.....51**
Tajbakhsh F, Hosseini MA, Sadeghi Ghahroudi M, Fallahi Khoshkenab M, Rokofian A, Rahgozar M
- Comparing barriers and facilitators of attending to cardiac rehabilitation programs from patients with coronary artery bypass graft surgery and rehabilitation specialists' viewpoints.....62**
Hajali Akbari Z, Hosseini MA, Nourozi K, Rahgozar M
- Rehabilitation needs of patients with physical disabilities due to traffic accidents for returning to the community: a qualitative study.....74**
Pashaei Sabet F, Norouzi Tabrizi K, Khankeh HR, Fallahi Khoshknab M