



## The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy Combined and Moderating Negative Cognitive Bias on Sexual Satisfaction, Sexual Intimacy in Men with Erectile Dysfunction

Neda Ghahramannejad <sup>1</sup>, Seyed Hamid Atashpour <sup>2\*</sup>, Flour Khayatan <sup>2</sup>

1- PhD student of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2- Professor of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

**Corresponding Author:** Seyed Hamid Atashpour: Professor of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

**Email:** [n.ghahraman.92@gmail.com](mailto:n.ghahraman.92@gmail.com)

Received: 2022/03/5

Accepted: 2022/10/9

### Abstract

**Introduction:** Low sexual satisfaction and sexual intimacy are among the functional consequences of erectile dysfunction that necessitate psychological interventions. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy combined and moderating negative cognitive bias on sexual satisfaction and sexual intimacy in men with erectile dysfunction. The method of this research was quasi-experimental (pre-test-post-test with control group).

**Methods:** The statistical population of this study included all men with erectile dysfunction in Isfahan in 2020 that among them, 30 people received a diagnosis of erectile dysfunction based on the entry criteria were selected as a statistical sample using available sampling and they were randomly assigned to one experimental groups and one control group (15 people in each group) all two groups completed the International Index of Erectile Function (1997), Larson Sexual Satisfaction (1988), Botlani & et al Sexual Intimacy (2010) as a pre-test and post-test. The intervention includes eight sessions of 60 to 90 minutes (two sessions per week for four weeks) cognitive-behavioral therapy and four sessions of 60 to 90 minutes (1 session per week for four weeks) moderating negative cognitive bias in the experimental group, the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using univariate analysis of covariance in SPSS.23.

**Results:** Based on the findings, it was found that cognitive-behavioral therapy combined and moderating negative cognitive bias was effective on the increase sexual satisfaction and sexual intimacy in men with erectile dysfunction ( $p = 0.001$ ).

**Conclusions:** Considering that combined cognitive-behavioral treatment and cognitive bias adjustment is effective in improving sexual satisfaction and sexual intimacy of men with erectile dysfunction; it seems that this method can be used as an effective intervention method in improving sexual satisfaction and sexual intimacy of men with erectile dysfunction.

**Keywords:** Cognitive-behavioral therapy, Moderating negative cognitive bias, Sexual Satisfaction, Sexual Intimacy, Erectile dysfunction.



## اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ

ندا قهرمان نژاد<sup>۱</sup>، سید حمید آتشپور<sup>۲\*</sup>، فلور خیاطان<sup>۲</sup>

۱- دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

۲- استاد، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

نویسنده مسئول: سید حمید آتش پور؛ استاد، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.  
ایمیل: n.ghahraman.92@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۷/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

### چکیده

**مقدمه:** رضایت جنسی و صمیمیت جنسی پایین از جمله پیامدهای کارکردی اختلال نعوظ به شمار میروند؛ که لزوم اجرای مداخلات روانشناختی را ضروری می سازند. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ بود.

**روش کار:** روش این پژوهش نیمه آزمایشی (پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان مبتلا به اختلال نعوظ شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ بود که از این میان تعداد ۳۰ نفر که براساس ملاکهای ورود تشخیص اختلال نعوظ را دریافت کردند، با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (۱۵ نفر در هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه های شاخص بین المللی عملکرد نعوظی (۱۹۹۷)، رضایت جنسی لارسون (۱۹۸۸) و صمیمیت جنسی بطلانی و همکاران (۱۳۸۹) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. مداخله شامل هشت جلسه ۶۰ الی ۹۰ دقیقه ای (هفته ای دو جلسه به مدت چهار هفته) درمان شناختی - رفتاری و چهار جلسه ۶۰ الی ۹۰ دقیقه ای (هفته ای ۱ جلسه به مدت چهار هفته) درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی در گروه آزمایش بود، گروه گواه هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS.23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**یافته ها:** براساس یافته ها مشخص شد که درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر افزایش رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ موثر بود ( $p=0/001$ ).

**نتیجه گیری:** با توجه به اینکه درمان ترکیبی ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی بر بهبود رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ موثر است؛ به نظر می رسد که می توان از این روش به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر در بهبود رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ استفاده کرد.

**کلید واژه ها:** درمان شناختی - رفتاری، تعدیل سوگیری شناختی منفی، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی، اختلال نعوظ.

## مقدمه

اختلال نعوظ یکی از شایعترین اختلالات جنسی در نزد مردان است؛ به طوری که تقریباً ۱۰ الی ۲۰٪ مردان این مشکل را در طول زندگی تجربه می کنند [۱،۲]. اختلال نعوظ مستلزم مشکل محسوس در رسیدن به نعوظ هنگام فعالیت جنسی و و حفظ کردن آن تا اتمام فعالیت جنسی و کاهش محسوس در سفتی نعوظ است که حداقل بایستی به مدت ۶ ماه ادامه داشته باشد و موجب ناراحتی قابل ملاحظه بالینی در فرد شده و ناشی از تأثیرات مواد / دارو یا بیماری جسمانی دیگر نباشد [۳]. اختلال نعوظی ممکن است با سایر تشخیص‌های جنسی همچون انزال زودرس و اختلال میل جنسی کم کار در مرد و همچنین اختلالات اضطرابی و افسردگی همزمان باشد [۲].

اختلال نعوظ پیامدهای کارکردی متعددی را برای مردان به دنبال دارد؛ برای مثال، شواهد نشان داده اند که مردان مبتلا به اختلال نعوظی از رضایت جنسی پایین تری در زندگی زناشویی برخوردار هستند [۴]. رضایت جنسی به میزان خرسندی فرد از روابط جنسی و توانایی فرد در ایجاد لذت متقابل اشاره دارد که دربرگیرنده رضایت از فعالیتهای جنسی و رضایت عاطفی و هیجانی است که در آن بر اهمیت احساسات و هیجانهایی مثبت، به ویژه ایجاد شادی و همچنین داشتن گفت وگویی خصوصی و صمیمانه درخصوص میزان علایق و انتظارات زوجین از فعالیت جنسی یکدیگر تأکید می شود [۵].

به علاوه، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اختلال نعوظی مردان با صمیمیت جنسی کاهش یافته میان همسرانشان ارتباط دارد [۶]. صمیمیت جنسی به معنای نیاز به ارتباط برقرار کردن، در میان گذاشتن و بیان افکار، احساسات، تمایلات و خیال پردازیهای جنسی و شهوانی با همسر است [۶]. صمیمیت جنسی همچنین نیاز و تمایل به انجام فعالیتهایی مانند نزدیکی جسمی، لمس کردن و نوازش کردن است که هدف اصلی آن تحریک جنسی، برانگیختگی و دستیابی به لذت جنسی برای هر دو طرف است. رفتارهایی نظیر بوسیدن، بغل کردن، رقصیدن، شوخی کردن، حمام رفتن و غیره که هدفشان برانگیختگی جنسی است، نمونه هایی از صمیمیت جنسی به شمار می روند [۷].

لذا، با توجه به پیامدهای کارکردی منفی که اختلال نعوظ برای مردان به دنبال دارد، درمان این اختلال ضروری

به نظر می رسد. درمان شناختی رفتاری از جمله درمان هایی است که در سالهای اخیر در درمان و بهبود نشانه های اختلال نعوظ به کار رفته است [۸]. درمان شناختی - رفتاری، رویکردی ساختاریافته و کوتاه مدت است که بر پایه مفاهیم واضح از سطوح شناخت شامل طرحواره (یا باورهای هسته‌ای)، فرضها (یا باورهای واسطه‌ای) و افکار یا تصورات خودآیند و شناخت بازنمایی های ذهنی ثابت و پایدار و تأثیر آن‌ها بر چگونگی پردازش اطلاعات بنا نهاده شده است [۹]؛ به کارگیری درمان شناختی - رفتاری در بهبود عملکرد جنسی این دسته از بیماران بر تصحیح تفسیرهای نابجا، هدایت خودگویی های منفی، اصلاح الگوهای غیرمنطقی تفکر و شناخت واره های ناکارآمد جنسی، با هدف راه اندازی پاسخ های مقابله ای کارآمد و سازگارانه و مهارگری هیجانهایی منفی تأکید دارد [۱۰].

در سالهای اخیر، اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان نشانه های اختلال نعوظ مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، باباخانی و همکاران [۱۱] تأثیر مشاوره درمان شناختی - رفتاری را بر کلیه ابعاد رضایت جنسی زنان نشان دادند. عطار بهنیا اصل و همکاران [۱۲] اثربخشی درمان شناختی رفتاری را بر افزایش صمیمیت جنسی زنان دارای اختلال کارکرد جنسی (بی میلی جنسی) نشان دادند، وطنخواه و همکاران [۱۳] نیز اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود صمیمیت جنسی در زنان مبتلا به اختلال جنسی مورد تأیید قرار دادند.

درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی رویکرد دیگری است که امکانسنجی آن در در بهبود نشانه های اختلال نعوظ مورد بررسی قرار گرفته است [۱۴]. درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی به راهبردهایی اشاره دارد که با استفاده از تمرین منظم و مکرر، سبک خاصی از پردازش شناختی را مورد هدف قرار میدهد و به عنوان یک درمان مستقل و با یک بخش الحاقی به درمان شناختی - رفتاری می تواند توسط کامپیوتر و با حداقل درگیری بالینی اجرا شود [۱۵]. در یکی از محدود مطالعات انجام گرفته در زمینه درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی که توسط دلیر و همکاران [۱۶] انجام شده است و به مقایسه این نوع از مداخله با درمان شناختی - رفتاری در اختلال وسواس - بیاختیاری پرداخته نشان داده است که درمان تعدیل سوگیری شناختی شدت نشانه های اختلال وسواس بی اختیاری، باورهای وسواسی و رفتارهای وسواسی را کاهش میدهد و درمان

تعدیل سوگیری شناختی اثربخشی بیشتری نسبت به درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌های اختلال وسواس - بی‌اختیاری، باورهای وسواسی و رفتارهای وسواسی دارد. قهرمان نژاد [۱۷] در پژوهشی نشان داد که درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی بر بهبود عزت نفس جنسی زنان مبتلا به ویتیلیگو مؤثر بود؛ اما بر روی خودآگاهی جنسی آنها تأثیری نداشت. Khan و همکاران [۱۸] نیز نشان دادند که درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و مهارکننده فسفودی استراز نوع ۵ (PDE5) تأثیر بیشتری بر سلامت روان، اضطراب و افسردگی و عملکرد جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ دارد.

چنانچه ملاحظه می‌شود، مطالعات پیشین اثربخشی درمان شناختی - رفتاری را در اختلالات جنسی زنان مورد بررسی قرار داده‌اند [۱۲، ۱۳]؛ درحالی که جامعه مورد بررسی ما مردان دارای اختلال نعوظ میباشد و درخصوص اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی بر اختلال نعوظ مطالعه‌ای در کشور ما صورت نگرفته است؛ همچنین، تاکنون مطالعه مدونی کارآیی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی را بر روی اختلال نعوظ مردان نشان نداده است؛ از طرفی با توجه به اینکه هر یک از مداخلات به تنهایی در بهبود مشکلات جنسی زنان موثر میباشد؛ لذا پژوهشگران فرض را بر این نهادند که ترکیب درمان شناختی - رفتاری با تعدیل سوگیری شناختی ممکن است بر بهبود مشکلات روانشناختی مردان مبتلا به اختلال نعوظ نیز موثر باشد؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ انجام شد.

## روش کار

این پژوهش نیمه آزمایشی، با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه (کد اخلاق به شماره IR.IAU.KHUISF.REC.1400.007) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه مردان مبتلا به اختلال نعوظ شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ بود. با توجه به اینکه در طرح‌های آزمایشی و نیمه آزمایشی برای افزایش اعتبار درونی، در هر یک از گروه‌ها حداقل بایستی ۱۵ نفر حضور داشته باشند [۱۹]، در این پژوهش تعداد ۴۵ نفر که براساس ملاکهای ورود به مطالعه تشخیص اختلال نعوظ را دریافت کردند، با

استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (۱۵ نفر در هر گروه) جایگزین شدند.

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از دریافت تشخیص اختلال نعوظ براساس دریافت نمرات بین ۱۶-۲۰ (نعوظ خفیف) در پرسشنامه شاخص بینالمللی عملکرد نعوظی (IIEF) با هدف بررسی تأثیر مداخلات بر کمترین حد اختلال نعوظ تا بالاترین سطوح آن؛ داشتن تحصیلات خواندن و نوشتن؛ دارا نبودن اختلال روانی شدید از قبیل روان‌پریشی، سوءمصرف مواد مخدر و الکل و یا اختلالات شخصیت براساس پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی (DSM-5)؛ عدم دریافت درمان شناختی - رفتاری قبل از ورود به پژوهش و یا عدم دریافت سایر مداخلات روانشناختی همزمان؛ داشتن انگیزه کافی برای شرکت در پژوهش؛ در حالی که عدم همکاری و یا تکمیل نکردن سوالات ابزارهای پژوهش و غیبت در ۲ جلسه پیاپی یا یک در میان معیارهای خروج از پژوهش را تشکیل می‌دادند. به منظور انتخاب نمونه و اجرای پژوهش، پس از صدور مجوز از سوی دانشگاه و موافقت مسئولین ذیربط به کلینیک اورولوژی، ناباروری و اختلالات جنسی آقایان یوروهلث و آی وی اف بیمارستان میلاد و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید واقع در شهر اصفهان مراجعه شد. پس از اعلام فراخوان، متناسب با حجم نمونه از مردان مبتلا به اختلال نعوظی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، به صورت تلفنی و حضوری ثبت نام به عمل آمد. سپس، روش و چگونگی اجرای کار برای شرکت‌کنندگان توضیح داده شد و رضایت آنها کسب گردید. به منظور رعایت اصول اخلاقی، فرم موافقت برای همکاری در پژوهش توسط آنها تکمیل شد و پژوهشگر به آنها اطمینان داد که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامه محرمانه خواهد بود. آموزش درمان ترکیبی در یکی از مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شهر اصفهان در شیفت عصر و توسط ۳ درمانگر شناختی - رفتاری که مستقل از تیم پژوهش بودند اجرا شد که سابقه اجرای درمان شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی - رفتاری را به مدت ۱ سال داشتند. گروه آزمایش در معرض درمان ترکیبی قرار گرفت؛ در حالی که گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. گروه‌های مورد بررسی طی دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به صورت گروهی ابزارهای پژوهشی را تکمیل کردند.

## ندا قهرمان نژاد و همکاران

و بررسی خلق، ایجاد ارتباط با جلسه گذشته، تنظیم دستور کار، مرور تکلیف منزل، بحث در خصوص موارد مندرج در دستور کار، تعیین تکالیف جدید، تهیه خلاصه ادواری و تهیه خلاصه نهایی و بازخورد از جلسه دوم به بعد، در طول کلیه جلسات انجام گرفت (جدول ۱). در پژوهش حاضر، روایی محتوایی برنامه جلسات درمان شناختی - رفتاری توسط ۴ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان در طی مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت.

در این پژوهش درمان شناختی - رفتاری با تعدیل سوگیری شناختی منفی با یکدیگر ترکیب شدند؛ بدین ترتیب که ابتدا درمان شناختی - رفتاری و سپس بلافاصله درمان تعدیل سوگیری شناختی منفی بر روی مردان مبتلا به اختلال نعوظ اجرا شد. درمان توسط پژوهشپران درمان شناختی - رفتاری. براساس پروتکل درمانی Boddi و همکاران [۱] به آزمودنی های گروه آزمایش در طی هشت جلسه ۶۰ الی ۹۰ دقیقه ای (هفته‌ای دو جلسه به مدت چهار هفته) به صورت گروهی طی جلسات زیر ارائه شد (ضمن اینکه به‌روز رسانی

جدول ۱. پروتکل درمان شناختی - رفتاری Boddi و همکاران [۱]

| جلسات      | محتوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جلسه اول   | برقراری ارتباط، جلب همکاری و اطمینان بخشی، ارتباط کلامی و غیرکلامی، معرفی روش درمان و تأثیر عوامل روانشناختی بر وضعیت جسمانی و عملکرد عضلات و اندام جنسی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلسه دوم   | اطلاع رسانی صحیح درباره عملکرد جنسی و ضرورت پردازش تفکرات مثبت جنسی همراه با آموزش آرامسازی، آشنایی با روش مسترز و جانشون و اجرای آن به صورت تکلیف خانگی و ارائه جزوه آموزشی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جلسه سوم   | ثبت رویدادهای ناگوار روزانه، عواطف و افکار منفی خودکار، شناسایی نشانه‌ها و علائم تنیدگی، راهبردهای مقابله با تنیدگی، بررسی توانایی تصویرسازی ذهنی و هدایتشده مربوط به فعالیت جنسی و آموزش آن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جلسه چهارم | مروری کوتاه بر جلسه قبل، انجام آرامش عضلانی و تنفس عمیق به مدت ۱۵ دقیقه، مرور افکار منفی یادداشت شده توسط شخص، بررسی افکار با کمک شخص و جایگزینی افکار منطقی با افکار غیرمنطقی و ناکارآمد، تهیه سلسله مراتبی از تصویرسازی جنسی و اجرای عمل به آن به منظور شرطی سازی مثبت و جایگزین کردن تصورات لذتجنس.                                                                                                                                                                                                  |
| جلسه پنجم  | مروری کوتاه بر جلسه قبل و تکلیف خانگی با کمک شخص، آموزش اجرای تمرین لذت بخش تناسلی تمرکز حسی بدون دخول و صرفاً با مالش آلت مرد بر کلیتوریس با استفاده از ژل و تکرار تمرین تا تداوم نعوظ در طول مالش، خودداری از آمیزش طی تمرینات حتی در صورت دستیابی به نعوظ کامل و تنها تمرین با هدف تمرکز بر تجربه احساسات لذت بخش به منظور کاهش عملکرد تقاضا و افزایش احتمال وقوع نعوظ ادامه می باید، ارائه تکلیف خانگی تمرین تمرکز حسی و به ویژه تأکید بر انجام آن در هنگام صبح به علت بالا بودن سطح تستوسترون خون. |
| جلسه ششم   | مروری کوتاه بر جلسه قبل و تکلیف خانگی با کمک زوجین، بررسی هیجانات ناخوشایند در هنگام انجام تمرین تمرکز حسی، افکار خوشایند مربوط به آن هیجانات، ترسیم جدول افکار ناخوشایند و پاسخ منطقی برای آنها، آموزش شروع دخول در مهبل (ابتدا به صورت بدون حرکت و عدم تلاش جهت رسیدن به ارگاسم در وضعیتی که زن بر روی مرد به صورت چهره به چهره قرار بگیرد)، ارائه تکلیف خانگی مجدد تمرکز حسی با هدف تحریک بیشتر و تمرین دخول بدون تحرک.                                                                              |
| جلسه هفتم  | مرور جلسات، بررسی فعالیتهای انجام شده توسط شخص و همسر وی و تأثیر آنها بر خلق و رفتار، انتخاب تکالیف و موقعیتهای تقویت کننده خلق مثبت، ارائه توصیه های درمانی به همسر وی در زمینه برنامه درمانی، ادامه تمرین تحریک توسط همسر، آموزش این نکته به همسر که با وقوع تجربه موقعیتهای جدید، آموزش های اولیه بایستی تکرار شده تا نعوظ به سرعت ایجاد و تداوم یابد (ادامه تحریک تا دستیابی به ارگاسم)                                                                                                             |
| جلسه هشتم  | بررسی پیشرفت مراجع، ارزیابی خلق و سایر هیجانات وی، تأکید بر استفاده مستمر از جلسات آموزشی برای فعالیت جنسی و جمع بندی و اختتام جلسات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

برنامه تعدیل سوگیری شناختی منفی در پژوهش Salemink و همکاران [۲۱] مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. طی این برنامه ۸۰ متن که دربرگیرنده ۶۰ سناریوی جنسی و ۲۰ سناریوی خنثی است به صورت تصادفی در سه نسخه (الف، ب، ج) که از نظر موضوعات مرتبط با تعامل و عملکرد جنسی باهم همتا هستند، قرار داده شده‌اند. هر نسخه تکلیف سوگیری سوگیری شناختی منفی شامل ۱۵ سناریوی جنسی و ۵ سناریوی خنثی است. سناریوهای غیرجنسی

برنامه تعدیل سوگیری شناختی منفی. برنامه‌ای محقق ساخته است که براساس پروتکل Teachman و Clerkin [۲۰] که به منظور تعدیل شدت نشانه های اختلال وسواس فکری و اجبار عملی ساخته شده بود، طراحی شد و توسط نرم افزار سوپرلب به صورت انفرادی با استفاده از یک تکلیف کدگذاری متنی اندازه گیری به آزمودنی های گروه آزمایش در طی چهار جلسه ۶۰ الی ۹۰ دقیقه ای (هفته‌ای ۱ جلسه به مدت چهار هفته) ارائه شد. اعتبار محتوایی

به منظور پنهان سازی هدف پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند. هر سناریو به صورتی مبهم پایان می یابد تا به آزمودنی ها اجازه دهد که تفسیر خودبخودی خویش از معنای متن را به کار ببرند. مرحله آزمون شامل دو بخش ارائه سناریوهای مبهم و آزمون بازشناسی است. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی برنامه جلسات تعدیل سوگیری شناختی منفی توسط ۴ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان در طی مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت.

اطلاعات در این پژوهش به وسیله ابزارهای زیر گردآوری شد:

پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظی. توسط Rosen و همکاران در سال ۱۹۹۷ به منظور ارزیابی نیرومندی نعوظ در مردان تهیه شده است و دارای ۱۵ سوال و پنج خرده مقیاس است که در یک طیف لیکرت پنج درجه ای (۰-۵) برای سوالات ۱ تا ۹ و (۱-۵) برای سوالات ۱۰ تا ۱۵ نمره گذاری می شود. نمرات این پرسشنامه در دامنه ای بین ۱۵ تا ۷۵ قرار دارد و نمرات پایین تر نشاندهنده اختلال نعوظ بالاتر است. چنانچه، کسب نمرات ۵-۱۰ بیانگر اختلال نعوظ شدید، نمرات ۱۱-۱۵ بیانگر اختلال نعوظ متوسط، نمرات ۱۶-۲۰ بیانگر اختلال نعوظ خفیف و نمرات ۲۱-۲۵ نشاندهنده عدم اختلال نعوظ است [۲۲]. Rosen و همکاران [۲۲] پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۲ برآورد کردند و روایی محتوایی این پرسشنامه را به صورت کلی مطلوب ارزیابی کردند. فیاض بخش، عزتی و ملکی راد [۲۳] روایی محتوایی پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظی را با نظر خبرگان مطلوب ارزیابی کرد و پایایی کل آن را در زنان و مردان مبتلا به بیماریهای کلیوی مزمن به وسیله روش آلفای کرونباخ ۰/۸۶ برآورد کردند. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظی توسط ۴ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسط روش همبستگی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۳ به دست آمد.

پرسشنامه رضایت جنسی لارسون. این پرسشنامه توسط Larson و همکاران در سال ۱۹۸۸ به منظور سنجش خرسندی فرد از روابط جنسی طراحی شد و دارای ۲۵ سوال و ۴ خرده مقیاس است که در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (۱=هرگز) تا (۵=همیشه) نمره گذاری می شود. سوالات ۲۵، ۲۴، ۲۰، ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴ به صورت معکوس نمره

گذاری می شوند. حداقل و حداکثر نمرات این پرسشنامه به ترتیب ۲۵ و ۱۲۵ است و نمرات بالا نشاندهنده رضایت جنسی بالاتر است. نمرات کمتر از ۵۰ بیانگر عدم رضایت جنسی، ۵۱-۷۵ رضایت جنسی پایین، ۷۶-۱۰۰ رضایت جنسی متوسط و نمرات بیشتر از ۱۰۰ نشاندهنده رضایت جنسی زیاد می باشد [۲۴]. Vieira و همکاران [۲۵] نیز پایایی کلی این پرسشنامه را در جمعیتی متشکل از زنان پرتغالی ۰/۹۵ برآورد کردند. بهرامی و همکاران [۲۶] پایایی کل این پرسشنامه را در بین زوجین نابارور با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۷ گزارش کردند و در بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان دادند که چهار عامل (تمایل به برقراری روابط جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی) ارزش ویژه بیشتر از یک داشته و چهار عامل پنهان، ۵۳/۲۱ درصد کل واریانس را تبیین کردند. تحلیل عاملی تأییدی مدل نهایی سازه پرسشنامه رضایت جنسی را تأیید کرد. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی پرسشنامه رضایت جنسی توسط ۴ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسط روش همبستگی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۱ به دست آمد.

پرسشنامه صمیمیت جنسی. این پرسشنامه توسط بطلانی و همکاران در سال ۱۳۸۹ به منظور سنجش صمیمیت در روابط جنسی ساخته شد و از ۳۰ سوال تشکیل شده است که در یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای (۱=هیچ وقت) تا (۴=همیشه) نمره گذاری می شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین ۳۰ و ۱۲۰ قرار دارد و نمره بالاتر نشاندهنده صمیمیت جنسی بیشتر است [۲۷]. بطلانی و همکاران [۲۷] در پژوهش خود روایی محتوایی آن را با نظر پنج متخصص مشاوره و روانشناس مورد تأیید قرار دادند و پایایی کل این پرسشنامه را در نمونه ای متشکل از ۷۰ زوج با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۸۱ به دست آوردند. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی پرسشنامه صمیمیت جنسی توسط ۴ نفر از اساتید دانشگاه آزاد اصفهان در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسط روش همبستگی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۰ به دست آمد. داده های با استفاده از روش های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون مجذور کای و تحلیل کواریانس تک متغیری در نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ با سطح معنی داری ۰/۰۵ مورد تجزیه و

در این پژوهش ۳۰ مرد مبتلا به اختلال نعوظ شرکت کردند که اطلاعات جمعیت شناختی شامل سن، تحصیلات، تعداد فرزند و مدت ازدواج در جدول ۲ ارائه شد.

تحلیل قرار گرفتند.

## یافته ها

جدول ۲: اطلاعات جمعیت شناختی مردان مبتلا به اختلال در گروههای دریافت کننده درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی و گواه

| متغیرهای جمعیت شناختی | گروه آزمایش<br>(درصد) تعداد | گروه گواه<br>(درصد) تعداد | P        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| سن                    | ۲۰-۳۰ ساله                  | ۵(۳۳/۳)                   | ۷(۴۶/۷)  |
|                       | ۳۱-۴۰ ساله                  | ۷(۴۶/۷)                   | ۳(۲۰)    |
|                       | ۴۱-۵۰ ساله                  | ۳(۲۰)                     | ۴(۲۶/۷)  |
|                       | ۵۱-۶۰ ساله                  | -                         | ۱(۶/۷)   |
| تحصیلات               | زیردیپلم و دیپلم            | ۸(۵۳/۳)                   | ۱۰(۶۶/۷) |
|                       | فوق دیپلم                   | ۲(۱۳/۳)                   | ۴(۲۶/۷)  |
|                       | لیسانس به بالا              | ۵(۳۳/۳)                   | ۱(۶/۷)   |
|                       | بی فرزند                    | ۷(۴۶/۷)                   | ۸(۵۳/۳)  |
| تعداد فرزند           | تک فرزند                    | ۱(۶/۷)                    | ۱(۶/۷)   |
|                       | دو فرزند                    | ۵(۳۳/۳)                   | ۳(۲۰)    |
|                       | بیش از دو فرزند             | ۲(۱۳/۳)                   | ۳(۲۰)    |

جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ در گروههای مورد مطالعه طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول ۳ ارائه شده است.

مطابق با نتایج آزمون مجذور کای در جدول ۲ ملاحظه می شود که بین گروههای آزمایش و گواه از نظر اطلاعات جمعیت شناختی تفاوت معنادری وجود ندارد و گروهها همگن هستند. آماره توصیفی متغیرهای رضایت

جدول ۳: آماره های توصیفی متغیرهای رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروههای دریافت کننده درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی و گواه

| متغیر       | گروه         | پیش آزمون<br>میانگین | پس آزمون<br>میانگین | انحراف معیار |
|-------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| رضایت جنسی  | درمان ترکیبی | ۶۷/۳۳                | ۵/۸۹                | ۶/۸۵         |
|             | گواه         | ۶۷/۲۶                | ۷/۴۳                | ۷/۲۲         |
| صمیمیت جنسی | درمان ترکیبی | ۴۸/۳۴                | ۶/۷۶                | ۶/۳۰         |
|             | گواه         | ۴۶/۸۰                | ۴/۷۹                | ۳/۷۳         |

رضایت جنسی ( $F=۰/۴۹۳$ ,  $p=۰/۶۱۴$ ) و صمیمیت جنسی ( $F=۲/۰۳۶$ ,  $p=۰/۱۴۳$ ) به وسیله آزمون لوین تأیید شد. به علاوه، همگنی ماتریس کواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس ( $F=۱/۲۷۳$ ,  $p=۰/۱۸۵$ ) مورد تأیید قرار گرفت. با توجه محقق شدن مفروضه ها تحلیل کواریانس، از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت متغیرهای رضایت جنسی و صمیمیت جنسی در گروههای دریافت کننده ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی و گواه استفاده شد (جدول ۴).

چنانچه در جدول ۳ ملاحظه می شود، پس از اجرای درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی، میانگین نمرات رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ از مرحله پیش آزمون به پس آزمون در گروه آزمایش افزایش یافت.

به منظور آزمون این تفاوت بین گروه آزمایش و گواه از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد. نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای رضایت جنسی و صمیمیت جنسی با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک با مقدار  $p>۰/۰۵$  مورد تأیید قرار گرفت، همگنی واریانس های نمرات متغیرهای

**جدول ۴:** نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت متغیرهای عزت نفس جنسی و عملکرد جنسی در گروههای دریافت کننده درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی و گواه

| متغیر       | منبع تغییرات | مجموع مجذورات | درجه آزادی | میانگین مجذورات | F       | معنی داری | مجذور ای تا | توان آماری |
|-------------|--------------|---------------|------------|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|
| رضایت جنسی  | پیش آزمون    | ۳۵۱/۹۲۶       | ۱          | ۳۵۱/۹۲۶         | ۸/۹۵۹   | ۰/۰۰۶     |             |            |
|             | گروه         | ۲۵۲۱/۰۳۱      | ۱          | ۲۵۲۱/۰۳۱        | ۶۴/۱۷۹  | ۰/۰۰۱     | ۰/۷۲        | ۱          |
|             | خطا          | ۹۴۲/۷۴۵       | ۲۴         | ۳۹/۲۸۱          |         |           |             |            |
|             | کل           | ۱۸۳۳۷۸/۰۰     | ۳۰         |                 |         |           |             |            |
| صمیمیت جنسی | پیش آزمون    | ۷/۳۶۹         | ۱          | ۷/۳۶۹           | ۰/۳۲۷   | ۰/۵۷۳     |             |            |
|             | گروه         | ۱۳۰۶۴/۶۸۷     | ۱          | ۱۳۰۶۴/۶۸۷       | ۵۷۹/۶۳۹ | ۰/۰۰۱     | ۰/۹۶        | ۱          |
|             | خطا          | ۵۴۰/۹۴۴       | ۲۴         | ۲۲/۵۳۹          |         |           |             |            |
|             | کل           | ۱۴۷۴۰۰/۰۰     | ۳۰         |                 |         |           |             |            |

$p < ۰/۰۵$

می کند که بهبود پردازش شناختی بالا به پایین منجر به افزایش کنترل توجه شده و این امر مانع پردازش تهدید می شود [۲۸]. در صورت ترکیب این روش با درمان شناختی-رفتاری که بر این اصل استوار است که علت مشکلات روانشناختی، آشفتگی یا سوگیری شناختی است (سبکهای خاص تفکر؛ برای مثال، تحریف های شناختی و انواع خاصی از باورها) به مردان مبتلا به اختلال نعوظ کمک می کند تا رضایت خود را از انجام رابطه جنسی افزایش دهند.

مطابق با دومین بخش از یافته های این پژوهش مشخص شد که درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ اثربخش است. هرچند، درخصوص این یافته پژوهش نیز مطالعه مشخصی صورت نگرفته، اما این یافته در راستای مطالعه داوری دولت آبادی و ترکان [۳۰] مبنی بر اثربخشی تعدیل سوگیری شناختی تفسیری از طریق تقویت تصویرسازی مثبت بر خود مراقبتی، کیفیت زندگی، سوگیری تفسیری و خلق افسرده بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، مطالعه عطار بهنیا اصل و همکاران [۱۲] مبنی بر اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افزایش صمیمیت جنسی زنان دارای اختلال کارکرد جنسی و همچنین پژوهش مرادیان و امیری [۳۱] مبتنی بر اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر صمیمیت جنسی زوجین دچار اختلالات زناشویی و نیز تحقیق اعتمادی و همکاران [۳۲] مبتنی بر تاثیر این رویکرد درمانی بر صمیمیت جنسی زوجین قرار می گیرد.

در این پژوهش، دو رویکرد سوگیری شناختی منفی با درمان شناختی - رفتاری ترکیب شده و تاثیر آنها بر صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ مورد تایید قرار گرفت. لذا، اثربخشی مداخله مذکور بر صمیمیت جنسی ممکن است

پس از وارد کردن متغیرهای هم تغییر نتیجه تک متغیره معنیداری با توجه به نمره رضایت جنسی ( $p = ۰/۰۰۱$ )،  $F(۲۴,۱) = ۶۴/۱۷۹$  و صمیمیت جنسی ( $p = ۰/۰۰۱$ )،  $F(۲۴,۱) = ۵۷۹/۶۳۹$  در بین گروههای دریافتکننده درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی و گواه داریم.

## بحث

مطابق با اولین یافته این پژوهش مشخص شد که درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر رضایت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ اثربخش است. علیرغم اینکه پژوهشی که کارآیی برنامه تعدیل سوگیری شناختی منفی را بر رضایت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ بررسی کرده باشد؛ مشاهده نشد، یافته های پژوهش حاضر در راستای مطالعاتی قرار می گیرد که نشاندهنده اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی منفی می باشند. به عنوان مثال، این یافته با نتایج مطالعات دلیر و همکاران [۱۶] مبنی بر تاثیر درمان تعدیل سوگیری شناختی بر نشانههای اختلال وسواس - بی اختیاری و مطالعه Salemink و همکاران [۲۱] مبنی بر تاثیر تعدیل سوگیری شناختی مبتنی بر اینترنت در کاهش علائم اضطراب، افسردگی، آشفتگی روانشناختی کلی بیماران اضطرابی هم راستا بود.

رایج ترین روش تعدیل سوگیری شناختی روش آموزش سناریوهای مبهم است که در این پژوهش به مردان مبتلا به اختلال نعوظ آموزش داده شد و باعث شد این بیماران به صورت مثبت، تفسیر مثبت بیشتری را تصدیق کنند [۲۸]. نتایج مطالعه Klumpp و Amir [۲۹] از این فرضیه حمایت

امکان کنترل متغیرهای مداخله گر فراهم شود. همچنین، تأثیر مداخله مورد بحث را پیگیری نمایند تا میزان ثبات نتایج در طول زمان مشخص شود.

### نتیجه گیری

با توجه به اینکه درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ تأثیر داشت؛ لذا، پیشنهاد می شود ضمن آگاهی رسانی در زمینه امکان استفاده از بسته نرم افزاری درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و تعدیل سوگیری شناختی منفی برای مردان مبتلا به اختلال نعوظ، این برنامه با هدف بهبود رضایت جنسی و صمیمیت جنسی به سهولت در اختیار بیماران و همسران آنها قرار بگیرد.

### سیاسکزاری

نویسندگان بر خود لازم می بینند از کلیه شرکت کنندگان در این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آورند.

### تعارض منافع

در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشد.

از طریق تغییر الگوی پردازش اطلاعات انتخابی و سوگیری های تفسیر در مردان مبتلا به اختلال نعوظ ایجاد شده باشد که براساس مدل های شناختی در ایجاد و حفظ اختلال نعوظ نقش دارند و در نتیجه منجر به افزایش بیشتر صمیمیت جنسی مردان مبتلا به اختلال نعوظ گردیده است. همچنین، عامل دیگری را که می توان بیان نمود ناشی از تأثیر ناآشکار درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر است. به علاوه، بهبود پردازش شناختی بالا به پایین، افزایش کنترل توجه و در نتیجه جلوگیری از پردازش تهدید [۲۹]، مواجهه با سطوح پایین محرک اضطراب و یادگیری تولید فعال معانی مثبت یابی خطر در شرایط مبهم [۲۸] نیز از جمله تبیین های احتمالی این یافته ها است.

باید توجه داشت پژوهش حاضر همچون هر پژوهشی با محدودیتهایی روبرو بوده است. این مطالعه تنها در سطح شهر اصفهان انجام شد. لذا قدرت تعمیم یافته های پژوهش به سایر نمونه ها را کاهش می دهد. از دیگر محدودیتهای پژوهش می توان به نمونه گیری هدفمند و استفاده از طرح نیمه آزمایشی به جای استفاده از طرح تمام آزمایشی اشاره کرد. عدم انجام پیگیری نیز از جمله محدودیت های اساسی این پژوهش بود. بنابراین، پیشنهاد می شود سایر محققان علاقمند به این حوزه، موضوع مورد بحث در این پژوهش را در سایر شهرها انجام دهند و از سایر طرحهای آزمایشی با نمونه گیری تصادفی استفاده کنند تا

### References

1. Boddi V, Castellini G, Casale H, Rastrelli G, Boni L, Corona G & et al. An integrated approach with vardenafil orodispersible tablet and cognitive behavioral sex therapy for treatment of erectile dysfunction: a randomized controlled pilot study. American Society Andrology. 2015;3(5):909-918. <https://doi.org/10.1111/andr.12079>
2. Carteiro DM, Sousa LM, Caldeira SM. Clinical indicators of sexual dysfunction in pregnant women: integrative literature review. Revista Brasileira de Enfermagem. 2016;69(1):165-173. <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2016690122i>
3. American Psychiatric Association. DSM 5: American Psychiatric Association; 2013.
4. Althof SE, Buvat J, Gutkin SW, Belger M, Stothard DR, Fugl-Meyer AR. Sexual Satisfaction in Men with Erectile Dysfunction: Correlates and Potential Predictors. Sex Med. 2010;7(1 Pt 1):203-15. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01554.x>
5. Barrientos J. The effect of sexual satisfaction on marital satisfaction of couples. Journal of Systemic-Applied Couples Therapy. 2016;32(1):351-68.
6. Botlani S, Shahsiah M, Padash Z, Ahmadi A, Bahramif. The effect of attachment-based couple therapy on couples attachment style, sexual intimacy and sexual satisfaction. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2012; 3(12):375-390.
7. Bagarozzi DA. Enhancing intimacy in marriage: a clinician's guide. Routledge; 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315787053>
8. Sasanpour M, Shahrodayan GH, Ahmadi SA. The Effectiveness of Sexual Cognitive Reconstruction Program for Couples on Reduction of Sexual Problems. Journal of Family Research. 2015;10(4):475-491.
9. White C. Cognitive behavioral therapy for

- chronic medical problems: A guide to assessment and treatment in practice. Chrichester: John Wiley & Sons Ltd;2001.
10. Amir Fakhraei A. The preliminary efficacy of cognitive behavioral therapy on sexual erectile dysfunction and comorbid psychological symptoms: a single case study. *Journal of Clinical Psychology and Personality*.2019;16(2):17-27.
  11. Babakhani N, Taravati M, Masoumi Z, Garousian M, Faradmal J, Shayan A. The Effect of Cognitive-Behavioral Consultation on Sexual Function among Women: a Randomized Clinical Trial. *J Caring Sci*.2018;7(2):83-88. <https://doi.org/10.15171/jcs.2018.013>
  12. Attar S, Behniya Asl F, Heydari Z, Mahmoodi N. The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on Increasing Sexual Intimacy and Reducing Body Image Concerns in Women with Sexual Dysfunction. *New advances in behavioral sciences*.2020;5(43):13-25.
  13. Vatankhah S, Bakhshipour Roodsari A. Studying the Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy in Improving Symptoms of Women's Orgasmic Disorder and Increasing Sexual Knowledge and Intimacy in Women with Sexual Dysfunction. *Journal of Modern Psychological Researches*.2019;14(54):253-272.
  14. Koster EHW, Fox E, MacLeod C. Introduction to the special section on cognitive bias modification in emotional disorders. *Journal of Abnormal Psychology*.2009;118(1):1-4. <https://doi.org/10.1037/a0014379>
  15. Rohrbacher H, Blackwell SE, Holmes EA, Reinecke A. Optimizing the ingredients for imagery-based interpretation bias modification for depressed mood: Is self-generation more effective than imagination alone? *Journal of affective disorders*.2014;152,212-218. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.09.013>
  16. Dalir M, Alipour A, Zare H, Farzad V. The Effect of Cognitive Bias Modification Therapy on Symptoms of Obsessive-compulsive Disorder: Comparison Efficacy of Cognitive Bias Modification Therapy and Group Cognitive-behavioral Therapy. *Clinical Psychology Studies*.2016;6(21):1-25.
  17. Ghahremannezhad N. The effectiveness of modulating negative cognitive bias on improving sexual self-esteem and sexual self-awareness of women with vitiligo skin disease in Isfahan. (dissertation). Esfehan: Islamic Azad University, Khorasghan Branch;2016;10-13.
  18. Khan S, Amjad A, Rowland D. Potential for Long-Term Benefit of Cognitive Behavioral Therapy as an Adjunct Treatment for Men with Erectile Dysfunction. *J Sex Med*.2019;16(2):300-306. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.12.014>
  19. Borg W, Gall J. Quantitative and qualitative research methods in psychology and educational sciences. Tehran: Beheshti University; 2015:455-6.
  20. Clerkin EM, Teachman BA. Training interpretation biases among individuals with symptoms of obsessive compulsive disorder. *Journal of Behavior Therapy Experimental Psychiatry* 2011; 42(3):337-43. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.01.003>
  21. Salemink E, Kindt M, Rienties H, Van den Hout M. Internet-based cognitive bias modification of interpretations in patients with anxiety disorders: a randomised controlled trial. *J Behav Ther Exp Psychiatry*2014;45(1):186-195. <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2013.10.005>
  22. Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J, Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): A multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. *Urology*.1997;49: 822-830. [https://doi.org/10.1016/S0090-4295\(97\)00238-0](https://doi.org/10.1016/S0090-4295(97)00238-0)
  23. Fayaz Bakhsh F, Ezzati A, Maleki RadAA. Sexual function and quality of life in male and female with chronic renal diseases. *rph*.2015;9(2):64-73.
  24. Larson JH, Anderson SM, Holman TB, Niemann BK. A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. *J Sex Marital Ther*.1998; 24(3):193-206. <https://doi.org/10.1080/00926239808404933>
  25. Vieira RX, Pechorro P, Diniz A. T08-P-10 Validation of Index of Sexual Satisfaction (ISS) for use with Portuguese women. *Sexologies*2008;17: S115. [https://doi.org/10.1016/S1158-1360\(08\)72833-0](https://doi.org/10.1016/S1158-1360(08)72833-0)
  26. Bahrami N, Yaghoobzadeh A, Sharif Nia H, Soliemani M, Haghdost A. Psychometric Properties of the Persian Version of Larsons Sexual Satisfaction Questionnaire in a Sample of Iranian Infertile Couples. *Irje*.2016;12(2):18-31.

27. Botlani S, Ahmadi SA, Bahrami F, Shahsiah M, Mohebbi S. Effect of attachment-based couple therapy on sexual satisfaction and intimacy. *Journal of Fundamentals of Mental Health*.2010; 2(46):496-505.
28. MacLeod C. Cognitive bias modification procedures in the management of mental disorders. *Current Opinion in Psychiatry*. 2012; 25 (2): 114-120. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32834fda4a>
29. Klumpp H, Amir N. Preliminary study of attention training to threat and neutral faces on anxious reactivity to a social stressor in social anxiety. *Cognitive Therapy and Research*.2010;34,263-271. <https://doi.org/10.1007/s10608-009-9251-0>
30. Davari DolatAbadi M, Torkan H. Efficacy of Cognitive Bias Modification for Interpretation via Promoting Positive Imagery on Self - care Activities, Quality of Life, Interpretation Bias and Depressed Mood in Type 2 Diabetes Patients. *Journal of Clinical Psychology*.2019;11(2):13-22.
31. Moradiyan F, Amiri H. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on marital satisfaction and sexual intimacy in couples with marital disorders, *Proceedings of the 6th scientific conference on educational sciences and psychology*. 2018.
32. Etemadi O, h NavvabiNezhad Sh, Ahmadi SA, Farzad V. A Study on the Effectiveness of Cognitive-Behaviour Couple Therapy on Couple's Intimacy That Refer to Counselling Centres in Esfahn. *Psychological*. 2006;2(1,2):69-87.